



## ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Marcela Nováková /545 110 471

E-MAIL: marcela.novakova@ukzuz.cz

DATUM: 24. 10. 2016

### Rozsah povoleného použití přípravku Discus

#### dělitelná balení

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
jabloň, hrušeň	strupovitost jabloně, strupovitost hrušně, padlí jabloňové	0,02 % (2 g/10 l vody)	28	1) od 53 BBCH do 81 BBCH	4) do počátku skanutí
angrešt, rybíz, borůvka, brusnice brusinka	americké padlí angreštové, padlí ( <i>Microsphaera</i> spp.)	0,02 % (2 g/10 l vody)	14	1) od 51 BBCH do 85 BBCH	4) do počátku skanutí
mák setý	helminthosporióza máku	2-2,5 g 4 l vody /100 m <sup>2</sup>	28	1) od 59 BBCH do 69 BBCH	
růže	padlí růžové, černá skvrnitost růže	2-3 g 10 l vody /100 m <sup>2</sup>	-	1) od 11 BBCH do 89 BBCH	5) venkovní prostory, skleníky

#### jednorázová balení o obsahu 1 g

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
jabloň, hrušeň	strupovitost jabloně, strupovitost hrušně, padlí jabloňové	0,02 % (1 g/5 l vody)	28	1) od 53 BBCH do 81 BBCH	4) do počátku skanutí
angrešt, rybíz, borůvka, brusnice	americké padlí angreštové, padlí	0,02 % (1 g/5 l vody)	14	1) od 51 BBCH do 85 BBCH	4) do počátku

brusinka	( <i>Microsphaera</i> spp.)				skanutí
mák setý	helminthosporiíza máku	1 g 2-2,5 l vody /50 m <sup>2</sup>	28	1) od 59 BBCH do 69 BBCH	
růže	padlí růžové, černá skvrnitost růže	1 g 3,3-5 l vody /50 m <sup>2</sup>	-	1) od 11 BBCH do 89 BBCH	5) venkovní prostory, skleníky

**jednorázové balení o obsahu 2 g**

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
jabloň, hrušeň	strupovitost jabloně, strupovitost hrušně, padlí jabloňové	0,02 % (2 g/10 l vody)	28	1) od 53 BBCH do 81 BBCH	4) do počátku skanutí
angrešt, rybíz, borůvka, brusnice brusinka	americké padlí angreštové, padlí ( <i>Microsphaera</i> spp.)	0,02 % (2 g/10 l vody)	14	1) od 51 BBCH do 85 BBCH	4) do počátku skanutí
mák setý	helminthosporiíza máku	2 g 4-5 l vody /100 m <sup>2</sup>	28	1) od 59 BBCH do 69 BBCH	
růže	padlí růžové, černá skvrnitost růže	2 g 6,7-10 l vody /100 m <sup>2</sup>	-	1) od 11 BBCH do 89 BBCH	5) venkovní prostory, skleníky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

(-) ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
jabloň, hrušeň	postřik, rosení	4x za rok	7-14 dnů
angrešt, rybíz, borůvka, brusnice brusinka	postřik, rosení	3x za rok	10-14 dnů
mák setý	postřik	1x	
růže	postřik	3x za rok	7-12 dnů

Při použití přípravku v angreštu nelze vyloučit příznaky fytoxicity na ošetřované plodině. Před ošetřením v borůvkách a brusinkách ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.