



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Libuše Konopíková /545 110 489

E-MAIL: libuse.konopikova@ukzuz.cz

DATUM: 19. června 2020

1. Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:

a) Označení z hlediska ochrany zdraví člověka podle přílohy II nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění:

EUH208 Obsahuje *Bacillus thuringiensis*. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

2. Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

a) Informace k příbalovému letáku dle přílohy I odst. 1 písm. p) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

b) Informace ke skladování přípravku podle přílohy I odst. 1 písm. q) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

Teplota skladování + 5 °C až + 30 °C.

c) Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

i. Obecná ustanovení

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

ii. Zvláštní bezpečnostní opatření pro obsluhu

SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

d) Informace o první pomoci ve smyslu přílohy I odst. 1 písm. g) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (podezření na kožní alergickou reakci) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

e) *Pokyny k použití osobních ochranných prostředků ve smyslu přílohy III bod 2 nařízení Komise (EU) č. 547/2011 pro osoby manipulující s přípravkem:*

Ochrana dýchacích orgánů	není nutná
Ochrana rukou	gumové nebo plastové rukavice
Ochrana očí a obličeje	při aplikaci postřikem směrem dolů není nutná ochranné brýle v případě ručního postřiku – ve výšce obličeje nebo směrem nahoru
Ochrana těla	ochranný oděv a nepromokavý plášť nebo turistická pláštěnka
Dodatečná ochrana hlavy	při aplikaci postřikem směrem dolů není nutná čepice se štítkem nebo klobouk v případě ručního postřiku – ve výšce hlavy nebo směrem nahoru
Dodatečná ochrana nohou	pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) s ohledem na práci v zahrádkářském terénu
Poškozené ochranné prostředky (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.	

3. *Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:*

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Po ukončení práce ve skleníku / fóliovníku opusťte ošetřované prostory.

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí rostlin.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného / oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí.

Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Všechny mikroorganismy se považují za možné senzibilizátory.

4. *Rozsah použití přípravku Lepinox Plus:*

1) **rozsah povoleného použití:**

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
----------------------------	---	------------------------	----	--	---

hrušeň, jablň	obaleči slupkoví a pupenoví	0,1 % (10 g / 10 l vody)	AT	2) na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stádia larvy	4) do počátku skanutí
broskvoň	obaleč východní, makadlovka broskvoňová	0,1 % (10 g / 10 l vody)	AT	2) na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stádia larvy	4) do počátku skanutí
réva	obaleč mramorovaný, obaleč jednopásý	0,1 % (10 g / 10 l vody)	AT	2) na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stádia larvy	4) do počátku skanutí
brokolice, kapusta, zelí, zelí pekingské, kapusta růžičková, vodnice, ředkev, salát, čekanka, šterbák zahradní (endivie), koslíček polníček, špenát, mangold, celer, petržel, hrách, fazol, tykev, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní, rajče, paprika, baklažán	blýskavka červivcová, černopáska bavlníková, makadlovka Tuta absoluta, zápředníček polní	10 g/100 m ² 4 – 8 l vody /100 m ²	AT	2) na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stádia larvy	5) venkovní prostory, skleníky
jahodník	blýskavka červivcová, černopáska bavlníková, zápředníček polní	10 g/100 m ² 4 – 8 l vody /100 m ²	AT	2) na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stádia larvy	5) venkovní prostory, skleníky
kořeninové rostliny a koření (kardamon, fenykl, bazalka pravá)	blýskavka červivcová, černopáska bavlníková, makadlovka Tuta absoluta, zápředníček polní	10 g/100 m ² 4 – 8 l vody /100 m ²	AT	2) na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stádia larvy	5) venkovní prostory, skleníky

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
baklažán, brokolice, celer, cuketa, čekanka, fazol, hrách, jahodník, kapusta, kapusta růžičková, kořeninové rostliny a koření, kozlíček polníček, mangold, meloun cukrový, meloun vodní, paprika, petržel, rajče, ředkev, salát, špenát, štěrбак zahradní (endivie), tykev, vodnice, zelí, zelí pekingské	postřik	3x	7 – 10 dnů
broskvoň, hrušeň, jabloň, réva	postřik, rosení	3x za rok	7 – 10 dnů

Lepinox Plus dosahuje průměrné účinnosti.

2) rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení:

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
okrasné rostliny, okrasné dřeviny	předivky, obaleči, píďalky, bekyně, bourovci, přástevník americký, bělásek ovocný, zavíječ zimostřezový	10 g/100 m ² 4 – 6 l vody / 100 m ²	–	2) od začátku výskytu do 2. vývojového stadia larvy	5) venkovní prostory, skleníky

(–) – ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
okrasné rostliny, okrasné dřeviny	postřik, rosení	3x za rok	7 – 10 dnů

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.