



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 603 00 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Libuše Konopíková /545 110 489

E-MAIL: libuse.konopikova@ukzuz.cz

DATUM: 30. června 2022

1. Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

a) Informace k příbalovému letáku dle přílohy I odst. 1 písm. p) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

b) Informace ke skladování přípravku podle přílohy I odst. 1 písm. q) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

Teplota skladování + 5 °C až + 30 °C

c) Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

i. Obecná ustanovení

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

ii. Zvláštní bezpečnostní opatření pro obsluhu

SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky vyvětrejte.

2. Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Vstup do ošetřeného pole/skleníku je možný minimálně až druhý den po poslední aplikaci.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Práce s přípravkem je nevhodná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.

3. Rozsah povoleného použití:

Magnicur Energy

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
zelenina košťálová	plíseň zelná, půdní oomycety	3 ml 3 l vody /m ²	AT	1) předpěstování rostlin	5) skleníky, foliovníky
okrasné rostliny	pravé plísň (oomycety)	25 ml 5 l vody /100 m ²	–	1) do výšky rostlin 50 cm 2) podle signalizace	5) skleníky, foliovníky
okurka	plíseň okurková	25 ml 6 l vody /100 m ²	3	2) podle signalizace	5) venkovní prostory
salát	plíseň salátová	25 ml 6-10 l vody /100 m ²	21	1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH 2) preventivně	5) venkovní prostory

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

(–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit.

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
okrasné rostliny, salát	postřik	3x	5-10 dnů
okurka	postřik	2x	7-10 dnů
zelenina košťálová	zálivka	2x	10-14 dnů

Přípravek vyzkoušejte na malém množství rostlin.