



## ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Jitka Jedličková / 545 110 433

E-MAIL: jitka.jedlickova@ukzuz.cz

DATUM: 6. 12. 2018

### Magnicur Quick – rozsah povoleného použití přípravku

#### dělitelná balení

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
réva	plíseň šedá	0,075-0,1 % (7,5-10 ml/10 l vody)	14	1) od začátku kvetení	4) do počátku skanutí
jahodník	plíseň šedá	0,15 % (15 ml/10 l vody)	3	1) od začátku kvetení, do odkvětu	4) do počátku skanutí 5) venkovní prostory
maliník, ostružiník	plíseň šedá	0,15 % (15 ml/10 l vody)	7	1) od začátku kvetení, do fáze zaměkání plodů	4) do počátku skanutí 5) venkovní prostory
meruňka, třešeň, višně	moniliová hniloba	0,1 % (10 ml/10 l vody)	3	1) od začátku vybarvování plodů, do konzumní zralosti	4) do počátku skanutí
meruňka, višně	moniliová spála	0,1 % (10 ml/10 l vody)	AT	1) od začátku kvetení, do odkvětu	4) do počátku skanutí
slivoň	moniliová hniloba	0,15 % (15 ml/10 l vody)	3	1) od začátku vybarvování plodů, do konzumní zralosti	4) do počátku skanutí

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
réva, jahodník, maliník, ostružiník, meruňka, třešeň, višně, slivoň	postřik, rosení	1x za rok

Nižší dávka z uvedeného rozmezí v révě se použije při nižším infekčním tlaku.

**Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení:**

**Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009**

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
broskvoň	moniliová hniloba	0,1 % (10 ml/10 l vody)	3		4) do počátku skanutí
okrasné rostliny	plíseň šedá	0,1 % (10 ml/10 l vody)	-	2) při ohrožení porostů, nejpozději při prvním výskytu	4) do počátku skanutí
rajče	plíseň šedá	0,1-0,15 % (10-15 ml/10 l vody)	3	2) od začátku výskytu	4) do počátku skanutí 5) skleníky
salát, paprika	plíseň šedá	0,1 % (10 ml/10 l vody)	3	2) od začátku výskytu	4) do počátku skanutí 5) skleníky
okurka	plíseň šedá	0,1 % (10 ml/10 l vody)	1	2) od začátku výskytu	4) do počátku skanutí 5) skleníky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

(-) – ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
broskvoň	postřik, rosení	1x za rok	
okrasné rostliny	postřik	1x za rok	
rajče	postřik	3x	7 dnů
salát, paprika, okurka	postřik	3x	7-10 dnů