



## ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Libuše Konopíková /545 110 489

E-MAIL: libuse.konopikova@ukzuz.cz

DATUM: 27. dubna 2021

### 1. Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

#### a) Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence dle přílohy I odst. 1 písm. l) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku tohoto mechanismu účinku (např. azoly, bitertanol, fenarimol), stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

#### b) Informace k příbalovému letáku dle přílohy I odst. 1 písm. p) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

Před použitím si přečtěte příložený návod k použití.

#### c) Informace ke skladování přípravku podle přílohy I odst. 1 písm. q) a r) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby.

#### d) Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

##### i. Obecná ustanovení

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

##### ii. Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí

SPE 3 účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržáním neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

### 2. Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Zamezte možnému úletu postřikové kapaliny.

Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce čeledi *Braconidae*.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

### 3. Rozsah povoleného použití:

#### Saprol – Proti houbovým chorobám růží

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
růže	padlí růžové, černá skvrnitost růže, rzi růžové	1 % (10 ml / 1 vody)	AT	max. 6x

AT – jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Dávka aplikační kapaliny: 6-12 l / 100 m<sup>2</sup> podle výšky rostlin.

Postřik ukončíme při dokonalém zvlhčení, nejpozději při počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Termín ošetření: Preventivně, nejpozději při zjištění prvních příznaků.

Interval mezi ošetřeními: 10-14 dnů

Předem ověřte reakci růží na ošetření na omezeném vzorku rostlin nebo citlivost pěstované odrůdy konzultujte s držitelem povolení.

Za velmi slunných a teplých dnů aplikujte pouze ráno nebo ve večerních hodinách.

Zpravidla sporadické hnědnutí listů se může projevit např. u odrůd Rock'n'Roll, Kleine Dortmunderin, City of London, Rose Pearl, Christel von der Post, Lilli Marleen, Rumba, Monica, Desiree, Montana.

Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby bylo vyloučeno zasažení jiných rostlin než růží.

V případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení nelze vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin.